

別表 1

内視鏡検査時に確認すべき抗血小板薬

種類	一般名	商品名	当院採用	内視鏡検査時の推奨休薬期間
アスピリン	アスピリン	バイアスピリン	採用	休薬せずに高出血リスク処置が可能 (休薬する場合の推奨休薬期間は5日間)
		アスピリン腸溶錠		
	アスピリン +ダイアルミネート	バファリン配合錠 A81		
		アスファネート配合錠 A81		
		ニトギス配合錠 A81		
アスピリン +ボノプラザンフマル酸塩	キャブピリン			
アスピリン +ランソプラゾール	タケルダ配合錠			
シロスタゾール	シロスタゾール	プレタール散		休薬せずに高出血リスク処置が可能 (休薬する場合の推奨休薬期間は1日間)
		プレタール OD 錠		
		シロスタゾール錠		
		シロスタゾール OD 錠	採用	
		シロスタゾール内服ゼリー		
チエノピリジン系	チクロピジン	パナルジン細粒		高出血リスク処置の場合は原則休薬する。 (休薬する場合の推奨休薬期間は7日間) ただし、アスピリン置換もしくはシロスタゾール置換によって高出血リスク処置は可能
		パナルジン錠		
		チクロピジン塩酸塩細粒		
		チクロピジン塩酸塩錠	院外専用	
	クロピドグレル	プラビックス錠		
		クロピドグレル錠		
	クロピドグレル +アスピリン合剤	コンプラビン配合錠		
ロレアス配合錠				
プラスグレル	エフィエント錠	採用		
	エフィエント OD 錠	採用		
チカグレロル	ブリリント錠	患者限定		
その他の抗血小板薬	イコサペント酸エチル(EPA)	エパデールカプセル		高出血リスク処置の場合は原則休薬する。 (休薬する場合の推奨休薬期間は1日間)
		エパデール S		
		エパデール EM カプセル 2g		
		イコサペント酸エチル粒状カプセル	採用	
		イコサペント酸エチル顆粒状カプセル		
		イコサペント酸エチルカプセル		
		エパロースカプセル		
		エパロース粒状カプセル		
	オメガ-3 脂肪酸エチル (EPA+DHA)	ロトリガ粒状カプセル	院外専用	
	サルボグレラート塩酸塩	アンブラーグ細粒		
		アンブラーグ錠		
		サルボグレラート塩酸塩錠	採用	
	ジピリダモール	ペルサンチン錠		
		ジピリダモール散		
		ジピリダモール錠		
	ジラゼブ塩酸塩水和物	コメリアンコーワ錠		
		ジラゼブ塩酸塩		
	トラピジル	ロコルナール錠		
	ベラプロストナトリウム	ドルナー錠		
プロサイリン錠				
ベラプロスト Na 錠		採用		
ケアロード LA 錠				
リマプロストアルファデクス	ベラサス LA 錠			
	オパールモン			
	プロレナール			
イフェンプロジル酒石酸塩	リマプロストアルファデクス錠	採用		
	セロクラール			
イブジラスト	イフェンプロジル酒石酸塩	採用		
	ケタスカプセル			