

| がん腫 | レジメン名称                               | 1クール日数 | N0. |
|-----|--------------------------------------|--------|-----|
| 乳癌  | トラスツズマブ<br>エムタンシン [カドサイラ]<br>(2回目以降) | 21日    | 23  |

|   | 薬品名                                  | 投与量                        | 投与時間        | 投与経路 | Day |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|--------------------------------------|----------------------------|-------------|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |                                      |                            |             |      | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ① | 生理食塩水                                | 20ml                       | ルート<br>キープ  | 点滴注射 | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ② | グラニセトロンパックス<br>デキサメタゾン注<br>クロルフェニラミン | 3mg/100ml<br>6. 6mg<br>5mg | 30分         | 点滴注射 | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ③ | トラスツズマブ エムタンシン<br>注射用蒸留水<br>生理食塩水    | 3. 6mg/kg<br>20ml<br>250ml | 30分<br>(※1) | 点滴注射 | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ④ | 生理食塩水                                | 50ml                       | 全開で滴下       | 点滴注射 | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

※1:0. 2又は0. 22 $\mu$ mインラインフィルター（ポリエーテルスルホン製又はポリスルホン製）を通して投与すること。  
トラスツズマブ エムタンシン 1回目は1時間30分滴下 2回目以降は30分滴下