

がん腫	レジメン名称	1クール日数	N0.
大腸癌	CAPIRI+BV	21日	16

	薬品名	投与量	投与時間	投与経路	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	生理食塩水	20ml	ルート キープ	点滴注射	↓																				
②	パロノセトロンパックス デキサメタゾン注 ホスネツピタント	0.75mg/50ml 4.95mg 235mg	30分	点滴注射	↓																				
③	生理食塩水	50ml	全開で滴下	点滴注射	↓																				
④	ペパシズマブ テルモ生食	7.5mg/kg 100ml	1時間30分 (※1)	点滴注射	↓																				
⑤	イリノテカン 5%ブドウ糖	150mg/m ² 250ml	2時間	点滴注射	↓																				
⑥	生理食塩水	50ml	全開で滴下	点滴注射	↓																				
⑦	カペシタビン	1600mg/m ² /日	1日2回 朝・夕食後	経口投与	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓					
⑧	デキサメタゾン錠	4mg/日	1日1回 朝食後	経口投与	↓	↓	↓																		

※1: 初回は1時間30分、異常がなければ2回目1時間、3回目以降は30分で滴下。

【カペシタビン投与量】	
体表面積 (m ²)	1日投与量 (mg)
1.31未満	1800
1.31～1.69未満	2400
1.69～2.07未満	3000
2.07以上	3600