

がん腫	レジメン名称	1クール日数	N0.
大腸癌	カペシタビン+BV	21日	24

	薬品名	投与量	投与時間	投与経路	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	生理食塩水	20ml	ルート キープ	点滴注射	↓																				
②	テルモ生食	100ml	30分	点滴注射	↓																				
③	ペバシズマブ テルモ生食	7.5mg/kg 100ml	1時間30分 (※1)	点滴注射	↓																				
④	生理食塩水	50ml	全開で滴下	点滴注射	↓																				
⑤	カペシタビン	2000mg/m ² /日	1日2回 朝・夕食後	経口投与	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓					
					↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓					

※1:初回1時間30分、異常がなければ2回目1時間、3回目以降は30分で滴下。

【カペシタビン投与量】	
体表面積(m ²)	1日投与量(mg)
1.36未満	2400
1.36～1.66未満	3000
1.66～1.96未満	3600
1.96以上	4200