

がん腫	レジメン名称	1クール日数	NO.
大腸癌	FOLF0X+セツキシマブ (2回目以降)	14日	3

	薬品名	投与量	投与時間	投与経路	Day													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
①	生理食塩水	20ml	ルート キープ	リザーバー より注入	↓													
②	パロノセトロンパックス デキサメタゾン注 クロルフェニラミン	0.75mg/50ml 9.9mg 5mg	30分	リザーバー より注入	↓													
③	セツキシマブ 生理食塩水	250mg/m ² 250ml	1時間	リザーバー より注入	↓													
④	テルモ生食	100ml	全開で滴下 (※1)	リザーバー より注入	↓													
⑤	オキサリプラチン 5%ブドウ糖	85mg/m ² 250ml	2時間 (※2)	リザーバー より注入	↓													
⑥	レボホリナート 5%ブドウ糖	300mg/body 250ml	2時間 (※2)	リザーバー より注入	↓													
⑦	5-FU テルモ生食	400mg/m ² 100ml	全開で滴下	リザーバー より注入	↓													
⑧	生理食塩水	100ml	全開で滴下	リザーバー より注入	↓													
⑨	5-FU 生理食塩水	2000mg/m ² 適量 全量100ml	46時間	リザーバー より注入	→													
⑩	デキサメタゾン錠	8mg/日	1日2回 朝・夕食後	経口投与		↓	↓											
⑪	ヘパフラッシュ	1000単位 /10ml	ヘパリン ロック	リザーバー より注入			↓											

	薬品名	投与量	投与時間	投与経路	Day													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
⑫	生理食塩水	20ml	ルート キープ	リザーバー より注入								↓						
⑬	テルモ生食 デキサメタゾン注 クロルフェニラミン	100ml 6.6mg 5mg	30分	リザーバー より注入								↓						
⑭	セツキシマブ 生理食塩水	250mg/m ² 250ml	1時間	リザーバー より注入								↓						
⑮	テルモ生食	100ml	全開で滴下 (※1)	リザーバー より注入								↓						

※1：infusion reaction観察。初回1時間、2回目以降は全開で滴下へ変更可。

※2：オキサリプラチンとレボホリナートは並列で投与。