

がん腫	レジメン名称	1クール日数	N0.
大腸癌	FTD/TPI+BV [ロンサーフ+BV]	28日	33

	薬品名	投与量	投与時間	投与経路	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	.	.	.	.	.	.	.	.	28				
①	生理食塩水	20ml	ルートキープ	点滴注射	↓															↓												
②	テルモ生食	100ml	30分	点滴注射	↓															↓												
③	ペバシズマブ テルモ生食	7.5mg/kg 100ml	1時間30分 (※1)	点滴注射	↓															↓												
④	生理食塩水	50ml	全開で滴下	点滴注射	↓															↓												
⑤	FTD/TPI	70mg/m ² /日	1日2回 朝・夕食後 (※2)	経口投与	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓			↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓																

※1: 初回1時間30分、異常がなければ2回目1時間、3回目以降は30分で滴下。

※2: 1日2回、5日間連続経口投与したのち2日間休薬する。これを2回繰り返したのち14日間休薬する。

【FTD/TPI投与量】	
体表面積(m ²)	1日投与量(mg)
～1.06	70
1.07～1.22	80
1.23～1.37	90
1.38～1.52	100
1.53～1.68	110
1.69～1.83	120
1.84～1.98	130
1.99～2.14	140
2.15～	150