

がん腫	レジメン名称	1クール日数	N0.
大腸癌	セツキシマブ+イリノテカン (2回目以降)	14日	35

	薬品名	投与量	投与時間	投与経路	Day													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
①	生理食塩水	20ml	ルート キープ	リザーバー より注入	↓													
②	パロノセトロンバック デキサメタゾン注 クロルフェニラミン ホスネツピタント	0.75mg/50ml 4.95mg 5mg 235mg	30分	リザーバー より注入	↓													
③	生理食塩水	50ml	ルート フラッシュ	リザーバー より注入	↓													
④	セツキシマブ 生理食塩水	250mg/m ² 250ml	1時間	リザーバー より注入	↓													
⑤	テルモ生食	100ml	1時間 (※1)	リザーバー より注入	↓													
⑥	イリノテカン 5%ブドウ糖	120mg/m ² 250ml	1時間30分	リザーバー より注入	↓													
⑦	生理食塩水	50ml	ルート フラッシュ	リザーバー より注入	↓													
⑧	デキサメタゾン錠	4mg/日	1日1回 朝食後	経口投与		↓	↓											
⑨	生理食塩水	20ml	ルート キープ	リザーバー より注入								↓						
⑩	テルモ生食 デキサメタゾン注 クロルフェニラミン	100ml 6.6mg 5mg	30分	リザーバー より注入								↓						
⑪	セツキシマブ 生理食塩水	250mg/m ² 250ml	1時間	リザーバー より注入								↓						
⑫	テルモ生食	100ml	全開で滴下 (※1)	リザーバー より注入								↓						

※1:infusion reaction観察。初回1時間、2回目以降は全開で滴下へ変更可。