

がん腫	レジメン名称	1クール日数	N0.
大腸癌	セツキシマブ (500mg/m ²) +イリノテカン	14日	36

	薬品名	投与量	投与時間	投与経路	Day													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
①	生理食塩水	20ml	ルート キープ	リザーバー より注入	↓													
②	パロノセトロンバック デキサメタゾン注 クロルフェニラミン ホスネツピタント	0.75mg/50ml 4.95mg 5mg 235mg	30分	リザーバー より注入	↓													
③	生理食塩水	50ml	ルート フラッシュ	リザーバー より注入	↓													
④	セツキシマブ 生理食塩水	500mg/m ² 500ml	2時間 (※1)	リザーバー より注入	↓													
⑤	テルモ生食	100ml	1時間 (※2)	リザーバー より注入	↓													
⑥	イリノテカン 5%ブドウ糖	120mg/m ² 250ml	1時間30分	リザーバー より注入	↓													
⑦	生理食塩水	50ml	ルート フラッシュ	リザーバー より注入	↓													
⑧	デキサメタゾン錠	4mg/日	1日1回 朝食後	経口投与		↓	↓											

※1: 初回500mg/m²を2時間で、2回目からは500mg/m²を1.5時間で。ただし、10mg/minの速度を超えないこと。

※2: infusion reaction観察。初回1時間、2回目以降は全開で滴下へ変更可。