

がん腫	レジメン名称	1クール日数	NO.
大腸癌	FOLFIRI+BV	14日	7

	薬品名	投与量	投与時間	投与経路	Day													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
①	生理食塩水	20ml	ルート キープ	リザーバー より注入	↓													
②	パロノセトロンバック デキサメタゾン注 ホスネツピタント	0.75mg/50ml 4.95mg 235mg	30分	リザーバー より注入	↓													
③	生理食塩水	50ml	全開で滴下	リザーバー より注入	↓													
④	ペバシズマブ テルモ生食	5mg/kg 100ml	1時間30分 (※1)	リザーバー より注入	↓													
⑤	イリノテカン 5%ブドウ糖	120mg/m ² 250ml	2時間 (※2)	リザーバー より注入	↓													
⑥	レボホリナート 5%ブドウ糖	300mg/body 250ml	2時間 (※2)	リザーバー より注入	↓													
⑦	5-FU テルモ生食	400mg/m ² 100ml	全開で滴下	リザーバー より注入	↓													
⑧	生理食塩水	100ml	全開で滴下	リザーバー より注入	↓													
⑨	5-FU 生理食塩水	2000mg/m ² 適量 全量100ml	46時間	リザーバー より注入	→													
⑩	デキサメタゾン錠	4mg/日	1日1回 朝食後	経口投与		↓	↓											
⑪	ヘパフラッシュ	1000単位 /10ml	ヘパリン ロック	リザーバー より注入			↓											

※1: 初回1時間30分、異常がなければ2回目1時間、3回目以降は30分で滴下。

※2: イリノテカンとレボホリナートは並列で投与