

| がん腫 | レジメン名称                                     | 1クール日数 | NO. |
|-----|--------------------------------------------|--------|-----|
| 大腸癌 | FOLFIRI<br>+セツキシマブ (500mg/m <sup>2</sup> ) | 14日    | 9   |

|   | 薬品名                                             | 投与量                                    | 投与時間        | 投与経路          | Day |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|---|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
|   |                                                 |                                        |             |               | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ① | 生理食塩水                                           | 20ml                                   | ルート<br>キープ  | リザーバー<br>より注入 | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ② | パロノセトロンバック<br>デキサメタゾン注<br>クロルフェニラミン<br>ホスネツピタント | 0.75mg/50ml<br>4.95mg<br>5mg<br>235mg  | 30分         | リザーバー<br>より注入 | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ③ | 生理食塩水                                           | 50ml                                   | 全開で滴下       | リザーバー<br>より注入 | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ④ | セツキシマブ<br>生理食塩水                                 | 500mg/m <sup>2</sup><br>500ml          | 2時間<br>(※1) | リザーバー<br>より注入 | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ⑤ | テルモ生食                                           | 100ml                                  | 1時間<br>(※2) | リザーバー<br>より注入 | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ⑥ | イリノテカン<br>5%ブドウ糖                                | 120mg/m <sup>2</sup><br>250ml          | 2時間<br>(※3) | リザーバー<br>より注入 | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ⑦ | レボホリナート<br>5%ブドウ糖                               | 300mg/body<br>250ml                    | 2時間<br>(※3) | リザーバー<br>より注入 | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ⑧ | 5-FU<br>テルモ生食                                   | 400mg/m <sup>2</sup><br>100ml          | 全開で滴下       | リザーバー<br>より注入 | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ⑨ | 生理食塩水                                           | 100ml                                  | 全開で滴下       | リザーバー<br>より注入 | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ⑩ | 5-FU<br>生理食塩水                                   | 2000mg/m <sup>2</sup><br>適量<br>全量100ml | 46時間        | リザーバー<br>より注入 | →   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ⑪ | デキサメタゾン錠                                        | 4mg/日                                  | 1日1回<br>朝食後 | 経口投与          |     | ↓ | ↓ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ⑫ | ヘパフラッシュ                                         | 1000単位<br>/10ml                        | ヘパリン<br>ロック | リザーバー<br>より注入 |     |   | ↓ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

※1:初回500mg/m<sup>2</sup>を2時間で。2回目からは500mg/m<sup>2</sup>を1.5時間で。ただし、10mg/minの速度を超えないこと。

※2:infusion reaction観察。初回1時間、2回目以降は全開で滴下へ変更可。

※3:イリノテカンとレボホリナートは並列で投与。