

がん腫	レジメン名称	1クール日数	N0.
胆管癌	ゲムシタビン+シスプラチン 【アプレピタントあり】	21日	14

	薬品名	投与量	投与時間	投与経路	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	生理食塩水	20ml	ルート キープ	点滴注射	↓							↓													
②	生理食塩水 【メインルート①】	500ml	1時間30分	点滴注射	↓							↓													
③	アプレピタント カプセル	125mg	メインルート開始と同時 に内服	経口投与	↓							↓													
④	パロノセトロンバック デカドロン 【側管①】（※1）	0.75mg/50ml 4.95mg	30分	点滴注射	↓							↓													
⑤	シスプラチン 生理食塩水 【側管②】	25mg/m ² 250ml	1時間	点滴注射	↓							↓													
⑥	生理食塩水 【メインルート②】	500ml	1時間30分	点滴注射	↓							↓													
⑦	ゲムシタビン テルモ生食 【側管③】	1000mg/m ² 100ml	30分	点滴注射	↓							↓													
⑧	マンニトール 【側管④】	300ml	30分	点滴注射	↓							↓													
⑨	生理食塩水 【メインルート③】	500ml	1時間30分	点滴注射	↓							↓													
⑩	アプレピタント カプセル	80mg	1日1回 朝食後	経口投与		↓	↓						↓	↓											
⑪	デキサメタゾン錠	4mg	1日1回 朝食後	経口投与		↓	↓						↓	↓											

メインルートは生理食塩水のみ
※1:メインルート1時間後より開始